

狂犬病預防

狂犬病的流行概況為何？

全球每年約有 55,000 人死於狂犬病，亞洲及非洲占大多數。亞洲國家中以印度、中國大陸及印尼病例數最多，印度每年死亡人數約 20,000 人，中國大陸每年死亡約 2,000 人。臺灣自 1959 年起不再有本土人類病例，2002 年、2012 年、2013 年各發生 1 例分別自中國大陸或菲律賓之境外感染病例。1961 年後未再出現動物的病例，但 2013 年於南投縣、雲林縣、臺東縣、花蓮縣、嘉義縣、台中市、臺南市、高雄市及屏東縣部分鄉鎮發現野生動物感染狂犬病毒之情形。

自 2014 年累計至 2016 年 4 月 28 日止，全國皆無境外或本土病例。

狂犬病有什麼症狀？

狂犬病初期症狀有發熱、頭痛或咬傷部位異樣感，數天後出現異常亢奮或恐懼現象，然後麻痺、吞嚥困難、咽喉部痙攣，並引起恐水現象(因喝水或看到水引起之喉部痙攣)，隨後併有精神錯亂及抽搐等情況，患者常因呼吸麻痺而死亡。

什麼是狂犬病？

狂犬病是由狂犬病病毒引起的神經性疾病，人類一般是被感染狂犬病病毒的哺乳動物抓咬傷而致病。發病時會有焦慮、頭痛、發燒、咬傷部位異樣感、恐水、肌肉麻痺，抽搐等症狀，最後因呼吸麻痺而導致死亡。

1. 狂犬病的傳染方式？

主要是被患有狂犬病之動物咬傷，唾液中之病毒可經由抓、咬，或經由皮膚傷口、黏膜而進入人體。

2. 預防狂犬病，被動物咬傷怎麼辦？

請謹記 1 記、2 沖、3 送、4 觀。1 記：保持冷靜，牢記動物特徵；2 沖：以肥皂及大量清水清洗傷口 15 分鐘，再以優碘或 70% 酒精消毒；3 送：儘速就醫評估是否接種疫苗；4 觀：盡可能將咬人動物繫留觀察 10 天，但若動物兇性大發，不要冒險捕捉。

3. 狂犬病疫苗之建議接種對象

- 目前符合暴露後狂犬病疫苗接種對象為遭野生哺乳類動物(含錢鼠)或流浪犬/貓抓咬傷者。
- 遭受無症狀家犬/貓抓咬傷，感染狂犬病的風險極低，建議不須接種疫苗。若家犬貓觀察十日內出現疑似狂犬病症狀，並經動檢機關高度懷疑，則給予疫苗。
- 建議接種對象將依疫情狀況適時調整，可至新北市政府衛生局網站 <http://www.health.ntpc.gov.tw/> 疾病防疫專區/急性傳染病/狂犬病專區/醫療資源查詢或撥打 02-2258-6923 查詢。

4. 狂犬病的潛伏期有多長？死亡率有多高？

- 狂犬病潛伏期從1至3個月不等，偶而短於7天，最長可達7年以上，視傷口嚴重程度、傷口部位神經分佈的多寡或與腦的距離、病毒株別、病毒量、衣服的保護程度及其他因素等而定。
- 狂犬病主要係由動物抓咬傷感染，而且被咬傷後，有疫苗施打，預防效果良好。但若經感染動物咬傷且未即時就醫處理，狂犬病發病及死亡率才會100%。

防疫12招

防疫12招

1. 洗手 (1500分)

2. 咳嗽戴口罩 (1000分)

3. 生病在家休息 (1200分)

4. 服藥兩週 錄影不傳染 (1000分)

5. 吃熟食、煮沸水 (1200分)

6. 按時打疫苗 (1000分)

7. 清除孳生源 (1200分)

8. 淺色長袖衣褲防蚊蟲 (1000分)

9. 避免接觸鳥島 (1000分)

10. 正確使用保險套 (1200分)

11. 生病速就醫 (1500分)

12. 防疫專線 (1200分)

9月28日世界狂犬病日

狂犬病 小學堂隨堂考

1 知識篇

- () ① 狂犬病是被染狂犬病毒的動物抓咬傷所造成
- () ② 狂犬病也會透過咳嗽、握手、傳染給另一個人
- () ③ 現在已經有人用疫苗，可以預防狂犬病
- () ④ 發現路邊死亡的動物，可撥打0800-761-590通報

2 生活篇

- () ① 看到野生動物，千萬不要靠近
- () ② 看到流浪狗、貓，不可以隨意招攬或逗弄
- () ③ 路邊發現生病的動物，先搬抬到安全處再通報
- () ④ 到狂犬病流行地區旅遊，不要招攬狗貓及野生動物

3 寵物篇

- () ① 狗貓每年都要打狂犬病疫苗
- () ② 不棄養寵物是預防狂犬病的方式之一
- () ③ 保護家中狗貓，避免狗貓與野生動物招攬

4 就醫篇

- () ① 被動物咬傷，要立即用清水沖洗傷口，並且就醫評估打疫苗
- () ② 被疑似狂犬病動物抓咬傷後，立即施打疫苗，預防狂犬病的效果好
- () ③ 雖然被野生動物抓咬傷，只流一點點血，不必擔心感染狂犬病

資料來源：衛生福利部疾病管制署、新北市政府衛生局